Detalle por Subzonas

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

Los **5 mm** que se registraron entre el lunes y martes en el corredor que une **Cañada de Gómez y Villa Eloísa no fueron suficientes para el trigo**. **El cultivo ya está encañando y espigando. Tampoco alcanzan para los maíces que están emergiendo o para incorporar los herbicidas preemergentes**. Se lleva sembrado un **80%** del maíz tempano intencionado. **Los ingenieros indican que se necesitan al menos 15 a 18 mm para terminar de implantar lo que resta**. Por el momento, no se piensa en pasar a otro cultivo.

"Ni bien llueva los productores continuarán con la siembra. **Queda tiempo hasta mediados de octubre para sembrar**", señalan. **El maíz implantado está sufriendo la falta de agua y está emergiendo en forma despareja**. El trigo necesitaba unos 15 mm para mejorar su condición y **no comenzar a perder rinde, "las reservas de agua no son suficientes para atravesar el periodo crítico del cultivo", advierten** los técnicos. Los cuadros se encuentran entre macollaje y espigazón. **Un 60% se lo considera en condiciones regulares. Para la siembra de soja, los barbechos están paralizados por la falta de agua**. Se necesitan al menos unos **40 mm** para arrancar con los perfiles llenos para recibir a la oleaginosa.

"**Las bajas temperaturas que se anuncian para esta semana pueden ayudar a mantener la condición de los cultivos**", indican los ingenieros de **Cañada Rosquín**. Ante la falta de agua y los pocos milimetrajes que se registraron entre lunes y martes, el frío puede limitar le pérdida de agua, explican. Llovió muy por debajo de los que se necesitaba: **5 mm en Acebal, 14 mm en Soldini, 4 m en Centeno y sin registros en Arminda, Galvez, Lopez y Cañada Rosquín**. **Se estima una reducción del rinde del trigo por disminuciones en el tamaño de los macollos.** La otra cara de la moneda, es que **por la sequía no se están observando enfermedades en las ultimas 3 hojas**, **incluida la hoja bandera.** Los ingenieros consideran que un 20% de cuadros de trigo están en excelentes condiciones, un 20% muy bueno y el 40% bueno y **20% regular**. Calculan un rinde de entre 50 a 60 qq/ha para los trigos que están en las mejores condiciones y 30 qq/ha para los que están regulares. **La siembra de maíz temprano se completó en la zona**. En los lotes que irán a soja no hay inconvenientes con las malezas por la falta de humedad. **Los técnicos indican que va a empezar notarse la falta de agua en el perfil para la siembra e inconvenientes en las aplicaciones.**

Casi no recibió lluvias **Carlos Pellegrini**. **La demanda de agua de agua del trigo es cada vez mayor: se encuentran espigando, atravesando el periodo crítico**. "**Si no llueve pronto no podrán desarrollarse los granos que potencialmente podrían generar por la gran cantidad de macollos que se formaron con el clima frio**", advierten los ingenieros. La siembra de maíz de primera avanzo en un **90%,** "**el resto estaba esperando la lluvia que nunca llegó**. De todos modos, van a seguir esperando. **Sembrarán si las lluvias llegan hasta el 15 de octubre**, **luego se pasaran a siembras de maíces de segunda en**

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente.

diciembre", indican los profesionales. **El 30% de los cuadros se sembró con la humedad muy justa y los nacimientos de esos lotes son desparejos. Han quedado semillas sin poder germinar y cuanto más tiempo pase sin llover mayor será la diferencia entre las emergidas con las que no lo hicieron.** Estas últimas van a perder en competencia con respecto a las otras, y será este **el primer efecto negativo de la presente campaña.** Con una lluvia de **20 a 30 mm** se puede sembrar la soja, ya que en el subsuelo la humedad está presente y con las coberturas que se realizaron, no habría problemas en sembrar. Ahora se están haciendo los tratamientos primaverales, preparando y liberando el suelo para poder realizar los preemergentees para la oleaginosa sin que estos tengan interferencias para poder tener la residualidad esperada para las malezas resistentes.

En la zona de **El Trébol** las lluvias fueron suficientes para completar con el **100% de la siembra de maíz**. El cereal sembrado está **emergiendo sin problemas**. Los trigos también fueron **beneficiados con las lluvias y mejoraron su condición**. Se califican como **muy buenos en el comienzo de su periodo crítico: 60% en hoja bandera y 40% en espiga embuchada.** Si bien los dos últimos eventos pluviométricos acumularon **27 mm**, **a corto plazo se necesitarían otros 20 mm** para que no se resigne el rinde del cereal. La siembra de soja requiere entre **70 a 100 mm** para arrancar con los perfiles llenos. Los barbechos se realizan con herbicidas residuales. Las malezas complicadas de la zona son el **yuyo colorado y el sorgo de Alepo, ambas con resistencias a ciertos herbicidas.**

SUBZONA II

Las tormentas esquivaron a Bigand: "no llovió nada. Los lotes trigueros están complicados y la siembra de maíz también", sintetizan los ingenieros. **Se logró hacer el 95% de la intención de siembra de maíz**. Lo que resta no se pudo completar por la falta de humedad, **y podría pasar a maíz tardío**. **Hasta el 10/10 sería la fecha límite para la siembra de maíz temprano**. **Pasado ese plazo, el periodo crítico caería en enero, con las mayores probabilidades de estrés en floración**. Los cuadros implantados hace 15 días **están naciendo en buenas condiciones. Los trigos están padeciendo el estrés por la falta de agua**. "**Los que están espigando son los que tendrían las mayores pérdidas de rinde**", advierten los ingenieros; "**ya no hay milimetraje que pueda asegurar el máximo potencial del trigo**", agregan. Para asegurar un buen perfil húmedo para recibir a la soja se necesitan por lo menos de **80 a 100 mm**. La mayoría de los lotes están bien barbechados.

SUBZONA III

En la zona de La Violeta el maíz temprano se terminó de sembrar casi en su totalidad. "**Lo que no se sembró hasta ahora, el productor lo va a pasar a soja por la gran apuesta financiera que es hacer maíz y por la incertidumbre política económicas a la que se le suma la falta de agua**", aclaran los técnicos. **Los nacimientos son regulares por falta de agua**. **Los acumulados de agosto y septiembre, o sea en 60 días, no superan los 10 mm. Los trigos están desplegando su hoja bandera, las lluvias no alcanzaron para recuperarlos.** "**Estimamos pérdidas potenciales de rinde de 30-40% y pueden agravarse si no llueve**", advierten preocupados. Sanitariamente están muy bien, con 1 a 2 pasadas de fungicidas. Para la soja se necesitan **entre 50-60 mm** para arrancar una siembra tranquila. Los lotes están barbechados, **salvos aquellos que salen de un maíz de segunda que necesitan un doble**

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente.

golpe. Se incrementó el área de control mecánico de malezas por una cuestión de malezas difíciles y costos. “Es muy complicado el control químico, su costo total de todo el ciclo se estima en **315 dólares**, reduciendo así el margen de ganancia de la oleaginosa”, detallan. "L**as malezas complicadas son rama negra por su resistencia a las ALS (herbicidas que actúan inhibiendo la enzima ALS), raigrass, yuyo colorado —que todavía no aparece— y todo tipo de gramíneas. Eleucine es la más compleja**", explican en el área.

SUBZONA VI

La última lluvia dejó unos 20 mm y algo de granizo sobre el área urbana de General Pinto. “A 2.000 metros a la redonda del pueblo casi no hubo acumulados”, señalan los ingenieros. Los trigos se están resintiendo ante la falta de agua. **Se los nota más bajos y con escaso desarrollo de hojas. Están con la hoja bandera desplegada y a los más adelantados ya se los puede ver asomando la espiga. Alrededor del 20 de octubre florecen los primeros cuadros**. Por la sequía no evolucionaron las enfermedades por lo cual no hubo necesidad de hacer aplicaciones para su control. **La siembra de maíz está paralizada en un 30%. Los técnicos indican que hasta el 10 de octubre hay tiempo para la siembra. Si no se llega a cultivar, muchos pasarán a maíz tardío y otros a soja. Aquellos que siembren entre fines de octubres y principios de noviembre correrán el riesgo de trasladar el periodo crítico del cultivo en las condiciones críticas del mes de enero.**

SUBZONA V

No se registraron lluvias en Noetinger. **Se lleva sembrado un 40% del maíz temprano**. **La humedad está muy justa para seguir avanzando, incluso las emergencias son desuniformes. Los trigos empezaron a marcar síntomas de estrés hídrico en los suelos con calidades inferiores, se registran pérdidas de macollos**. Los sectores de mejor calidad aún mantienen una buena performance. Un poco más de la mitad de los cuadros se los clasifica entre excelentes y muy buenas condiciones, pero del resto, **un 20% descendió a condiciones buenas y otro 20% es considerado como regular.** Se los encuentra **desde encañando hasta con la espiga embuchada**. Los lotes destinados a soja poseen buenas

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente.